

NOUVEAU

FRAP®

L'EXPERT ANTI-RONGEURS

SOURIS

FRAP® PAT' - SECURI'PACK®

• PRÊT À L'USAGE

• AUCUN CONTACT AVEC L'APPÂT

FABRIQUÉ À PARTIR DE 80% DE MATIÈRE RECYCLÉE



LA SOURIS EST CURIEUSE ce qui la conduira à rentrer rapidement dans le SECURI'PACK®.

RECOMMANDE PAR LES PROS RECOMMANDE

TESTÉ ET VALIDÉ EN CONDITIONS RÉELLES PAR NOS EXPERTS.

CONTIENT 50 g PÂTE

FABRIQUÉ en FRANCE

TOUS LIEUX



Tappez le code 13788 pour accéder à la fiche du produit, nos conseils et tutos.

www.frap.expert/conseils

POUR BIEN UTILISER CE PRODUIT connectez-vous sur



MODE D'EMPLOI

1. À la 1ère utilisation, tourner le bouton central pour passer le clip de sécurité.
2. Positionner SECURI'PACK® sur ON pour l'activer ; SECURI'PACK® peut-être posé soit horizontalement, le côté plat contre un mur ou une plinthe, soit verticalement pour les endroits exigus.

3. Après éradication, repositionner sur OFF. S'il reste de l'appât dans SECURI'PACK®, le stocker dans un endroit sûr. Plusieurs utilisations sont possibles jusqu'à consommation totale de l'appât.
4. Quand l'appât dans SECURI'PACK® est entièrement consommé, mettre SECURI'PACK® au rebut dans un circuit de collecte approprié.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Lire et respecter les informations sur le produit ainsi que toutes les informations qui accompagnent le produit ou celles fournies sur le point de vente avant de l'utiliser. SECURI'PACK® est un poste d'appâtage pré-appâté sécurisé qui contient 50g de pâte à base de diféthialone 25mg/kg. Prêt à l'usage.

AVANT UTILISATION	• Avant d'utiliser des produits rodenticides, envisager la possibilité de recourir à des méthodes de contrôle non chimiques (des pièges par exemple). • Retirer toute nourriture facilement accessible pour les rongeurs (par exemple, des céréales éparpillées ou des déchets alimentaires). • Par ailleurs, ne pas nettoyer la zone infestée juste avant le traitement car cela perturbe la population des rongeurs et rend l'acceptation de l'appât plus difficile. • Ne pas ouvrir SECURI'PACK® contenant l'appât. • Ne pas manger, boire, ni fumer lors de l'utilisation du produit. • Se laver les mains et toute zone de la peau directement exposée après avoir utilisé le produit.
POSITIONNER LE PRODUIT	• SECURI'PACK® est prêt à poser. Sa mise en fonctionnement est simple et pratique, position ON et OFF, suivre les recommandations situées sur le rabat de l'emballage. • SECURI'PACK® doit être placé à proximité immédiate de l'endroit où l'activité de rongeurs a été observée (par exemple, parcours, sites de nidification, parcs d'engraissement trous, terriers, etc). • SECURI'PACK® doit, si possible, être fixé au sol ou à d'autres structures. • Placer le SECURI'PACK® hors de la Portée : des enfants, oiseaux, animaux domestiques, animaux d'élevage et autres animaux non cibles. • Placer le SECURI'PACK® à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux, ainsi que des ustensiles ou des surfaces qui entrent en contact avec ces derniers. Ne pas placer le SECURI'PACK® à proximité de systèmes d'évacuation des eaux où il pourrait entrer en contact avec de l'eau. • Si SECURI'PACK® est vide, le remplacer par un nouveau jusqu'à l'arrêt de la consommation. • SECURI'PACK® doit être inspecté au minimum tous les 2 à 3 jours après le début du traitement puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté, le compartiment central transparent permet de suivre la consommation de l'appât mais également de vérifier si le poste SECURI'PACK® n'est pas altéré. • En raison de leur mode d'action retardé, les rodenticides anticoagulants agissent entre 4 et 10 jours après consommation de l'appât.
APRÈS UTILISATION	• Retirer le SECURI'PACK® au terme de la période de traitement. • S'il reste de l'appât, mettre en position OFF pour fermer l'accès à l'appât et le stocker pour une prochaine utilisation. • Lors cette inspection, en profiter pour retirer les cadavres des rongeurs. Ne pas toucher les cadavres de rongeurs à mains nues ; porter des gants ou utiliser des instruments tels que des pinces pour les éliminer. Les rongeurs peuvent être porteurs de maladies.
CONSEIL D'EXPERT	• SECURI'PACK® est prêt à l'usage, il ne nécessite aucune manipulation de l'appât. Le positionner sur ON pour permettre l'accès à l'appât par les rongeurs. • Poser le SECURI'PACK® verticalement ou horizontalement le long du mur au plus près des indices de passage. • Nous vous conseillons de mettre 1 SECURI'PACK® par pièce infestée. Si l'utilisation de plus d'un SECURI'PACK® est nécessaire, la distance minimale entre les SECURI'PACK® doit être de 1 mètre.

MESURE DE GESTION DES RISQUES

- Envisager l'adoption de mesures de contrôle préventives (combler les trous, retirer autant que possible les aliments et boissons éventuels, etc.) pour améliorer l'ingestion du produit et réduire le risque de nouvelle infestation.
- Ne pas utiliser de rodenticides anticoagulants en guise d'appâts permanents (par exemple, pour éviter toute infestation de rongeurs ou pour détecter l'activité de rongeurs).
- L'utilisation de ce produit devrait permettre d'éliminer les rongeurs sous 35 jours.
- En cas de soupçon d'inefficacité à la fin du traitement (en d'autres termes, si l'activité des rongeurs continue d'être observée), l'utilisateur doit demander conseil au fournisseur du produit ou contacter un service de contrôle des organismes nuisibles.
- Rechercher et éliminer les cadavres de rongeurs pendant le traitement, au minimum chaque fois que le SECURI'PACK® est inspecté.
- Éliminer les cadavres de rongeurs dans un circuit de collecte approprié.

Pour plus d'information retrouvez-nous sur www.frap.expert

LIPHATECH

Distribué par : LIPHATECH S.A.S - Bonnel CS10005 - 47480 Pont Du Casse (France) Tél : 05 53 69 35 70

Se conserve jusqu'à : voir date mentionnée sous l'emballage 800 13788

Code EAN 13 FACTICE Grossissement 0.8 3495694167882 En Noir

RECOMMANDATIONS SÉCURITÉ



PREMIERS SECOURS

- Ce produit contient une substance anticoagulante. En cas d'ingestion, parmi les symptômes pouvant apparaître, parfois avec un certain retard, figurent des saignements de nez et des saignements gingivaux. Dans certains cas graves, des contusions et la présence de sang dans les selles ou les urines peuvent être observées.
- Antidote : administration de vitamine K1 par du personnel médical vétérinaire uniquement.
- En cas :
 - d'exposition cutanée, nettoyer la peau à l'eau puis à l'eau savonneuse.
 - d'exposition oculaire, rincer les yeux avec une solution de rinçage oculaire ou de l'eau en gardant les paupières ouvertes au moins 10 minutes.
 - d'exposition orale, rincer soigneusement la bouche avec de l'eau. Ne jamais rien administrer par voie orale à une personne inconsciente. Ne pas provoquer de vomissement.
 - d'urgence, appeler le 15 ou le centre anti-poison.
 - En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin et présentez-lui le contenant du produit ou l'étiquette. Contacter un vétérinaire en cas d'ingestion par un animal domestique.

INSTRUCTIONS POUR L'ÉLIMINATION

Une fois le traitement terminé, mettre au rebut le SECURI'PACK® ainsi que l'emballage, dans un circuit de collecte approprié.

RECOMMANDATIONS DE STOCKAGE

Conserver le produit dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Maintenir le SECURI'PACK® bien fermé sur la position OFF et le mettre à l'abri de toute exposition directe au soleil. Entreposer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques et animaux d'élevage. Conserver l'emballage de ce produit tant qu'il y a de l'appât dans SECURI'PACK®.

SECURI'PACK® Modèle communautaire enregistré n° 007654991-0001

FRAP® PAT' AMM N° FR-2012-0500 • Détenteur de l'autorisation : Liphatech S.A.S - Bonnel - CS10005 - 47480 Pont Du Casse (France) - Tel : 05 53 69 35 70 • Composition : Diféthialone 0.0025% (25mg/kg) - (n° CAS 104653-34-1) • Formulation : Pâte - Appât prêt à l'emploi • Type de produit : TP 14 rodenticide • Catégorie d'utilisateur : Non professionnels • Organismes cibles : Mus musculus (souris domestique) • Domaines d'utilisation : Intérieur.



ATTENTION

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes (sang) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P273 Eviter le rejet dans l'environnement. P314 Consulter un médecin en cas de malaise. P501 Éliminer le contenu / le récipient selon la réglementation en vigueur. Dangereux pour la faune. Dangereux pour les chiens et les chats.