Les rongeurs domestiques

LE RAT BRUN ou RAT D'EGOUTS
(Rattus norvegicus)

300 à 500 g

- Longueur tête + corps (sans la queue) : **19 à 26 cm**
- Queue **plus courte** que l'ensemble tête + corps
- Oreilles **arrondies**, plutôt **petites**

REPRODUCTION

5 à 6 portées/an • 6 à 12 petits par portée

INDICES DE PRÉSENCE

- **Crottes en « noyaux d'olives »** de 10 à 15 mm
- **Odeur** d'urine
- Traces grasses, brunâtres, **empreintes** au sol
- **Coulées** dans la végétation et destruction des végétaux et terriers.
- **Dégâts :** ronge les matériaux, câbles électriques, consomme et souille les denrées alimentaires

COMPORTEMENT

- Vit dans les **lieux humides**, sous-sol des habitations, les endroits sombres, les berges, égoûts
- **Fait des terriers dans les talus et champs**, rayonne de 20 à 100m autour du terrier
- A besoin d'**eau** en permanence
- Ne consomme pas les aliments souillés
- **Carnivore et granivore**. Amasse des réserves alimentaires

Les rongeurs domestiques

LE RAT BRUN ou RAT D'EGOUTS

(Rattus norvegicus)

LES FONDAMENTAUX POUR UN TRAITEMENT EFFICACEET SÉCURISÉ CONTRE LES RONGEURS DOMESTIQUES

- **Repérer** les indices de présence (crottes, nids ou terriers, dégâts...) et disposer les appâts près de ceux-ci
- **Condamner** au maximum les accès des rongeurs
- **Eliminer** ou rendre inaccessibles les sources de nourriture qui attirent les rongeurs
- **Ré-appâter** jusqu'à ce que la consommation des appâts cesse
- Dans la mesure du possible, **privilégier** une lutte sécurisée en installant les appât dans des SÉCURI'boîtes Aegis

NOS CONSEILS

Les souris consommant très peu de nourriture à la fois et ayant un rayon d'action limité à quelques mètres autour du nid, **disposez des appâts très rapprochés partout où vous voyez des crottes.**
Soyez vigilant, l'infestation peut reprendre très vite